

TRAŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS AMONIO SALIETRA

Augalų grupė, augalų pavadinimas	Tręšimo periodas	Trašų norma, kg/ha
Javai:		
Žieminiai kviečiai	Prieš sėją Pavasari atsinaujinus vegetacijai Bamblių tarpsnyje Plaukėjimo tarpsnyje	Iki 100 180-260 90-130 60-90
Žieminiai rugiai	Prieš sėją Pavasari atsinaujinus vegetacijai Šakniagumbių tarpsnyje	Iki 60 200-260 90-180
Vasarojus	Prieš sėją Krūmijimosi – šakniagumbių metu	150-230 90-120
Varpinių– ankštinių javų mišinys grūdams	Prieš sėją	90-120
Varpinių– ankštinių javų mišinys žaliajai masei	Prieš sėją	180-220
Rapsai:		
Žieminiai rapsai	Prieš sėją Pavasari vegetacijai atsinaujinus Butonizacijos metu	70-100 280-320 90-120
Vasariniai rapsai	Prieš sėją Butonizacijos metu	230-280 90-120
Šakniavaisiai ir šakniagumbiai:		
Pašariniai runkeliai	Prieš sėją 6-10 lapelių tarpsnyje	300-380 180-220
Cukriniai runkeliai	Prieš sėją 6-10 lapelių tarpsnyje	260-350 90-120
Bulvės	Prieš sodinimą Nuo sudygimo iki bulvėms pasiekus 15-20 cm aukščio	300-350 60-90
Linai (*-aliejiniai) (**-pluoštiniai)	Prieš sėją Eglutės tarpsniu	110-170*/100** 110-170*/50**
Pievos ir ganyklos:	Pavasari vegetacijai atsinaujinus Po nuganyto ar nušienavimo	Iki 260 180-210
Kukurūzai	Prieš sėją	300-350
Daržovės	Prieš sėją	90-250
Vaismedžiai ir vaiskrūmiai:		
Uogynai	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasari Vėlesniais metais	90-120 180-210
Kaulavaisiai	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasari Vėlesniais metais	120-150 220-250
Sėklavaisiai	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasari Vėlesniais metais	150-180 250-280
Žolynai ir vejos	Pavasari vegetacijai atsinaujinus Po nušienavimo	Iki 300 50-150

Pastabos:

1. Vidutinės trašų normos tikslinamos atsižvelgiant į dirvožemyje bei augaluose esantį azoto kiekį, planuojamą užauginti derlių, augalų veisles, meteorologines ir kitas sąlygas.