

TRAŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS KARBAMIDO IR AMONIO SALIETROS TIRPALAS (KAS)

| Augalai | Preparato norma, l / ha | Purškimo laikas |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Žieminiai javai | 50-80 | Prieš sėją |
| | 150-200 | Pavasari vegetacijai atsinaujinus |
| | 50-80 | Bamblėjimo tarpsnyje |
| | 20-40 | Plaukėjimo tarpsnyje |
| | 10-20 | Pieninės brandos tarpsnyje |
| Žieminiai rapsai | 50-80 | Prieš sėją |
| | 180-230 | Pavasari vegetacijai atsinaujinus |
| | 60-90 | Butonizacijos tarpsnyje |
| | 10-30 | Prieš žydėjimą |
| Vasariniai rapsai | 200-300 | Prieš sėją |
| | 50-80 | 4-5 lapų tarpsnyje |
| | 10-40 | Butonizacijos tarpsnyje |
| Vasariniai javai | 150-250 | Prieš sėją |
| | 70-110 | Krūmijimosi tarpsnyje |
| | 40-70 | Bamblėjimo tarpsnyje |
| Cukriniai runkeliai | 150-300 | Prieš sėją |
| | 50-80 | Intensyvaus lapų augimo tarpsnyje |
| Kukurūzai | 150-250 | Prieš sėją |
| Bulvės | 150-250 | Prieš sodinimą |
| Pievos ir ganyklos | 150-250 | Vegetacijai atsinaujinus |
| | 70-150 | Po kiekvieno nuganymo ar pjūties |
| Lauko daržovės | 100-250 | Prieš sėją |
| | 30-70 | Vegetacijos metu |